

Vogels, waargenomen omstreeks 1943 op de buitenplaats  
 Geschreven 1957 "Ter Hooge" op Walcheren, (Gem. Koudekerke),  
 door A.J.H. baron van Lynden.

1. Dodaars. (Podiceps r. ruficollis)  
 Tegenwoordig geregeld in minstens 2 paren broedend. In 1939 ontdekte ik voor 't eerst de jongen. Waarschijnlijk vond het broeden al een paar jaar eerder plaats. Bijna zeker is het, dat het dichtgroeien van de vijver het optreden dezer soort in gunstige zin heeft beïnvloed.
2. Aalscholver. (Phalacrocorax carbo sinensis)  
 4 April 1942 kwam een exemplaar uit Oostelijke richting naar de grote vijver, waar het herhaaldelijk trachtte zich in een abeel tussen de aldaar nestelende Blauwe Reigers neer te zetten, hetgeen steeds door de Roeken werd belet. Later, toen de plaats onder zeewater stond heeft de aalscholver er gebroed.
3. Blauwe Reiger. (Ardea c. cinerea)  
 Sinds 1938 broedend en wel in toenemend aantal; 1943: 38 nesten, de meeste in abelen.
4. Ooievaar. (Ciconia c. ciconia)  
 Jaren geleden wel eens overtrekkend; volgens de arbeiders vroeger dikwijls op de omliggende weiden fouragerend en blijkens oude gravures in die tijd op het kasteel broedend.
5. Grauwe Gans. (Anser anser)  
 In het najaar overtrekkend; vroeger op het ondergelopen weiland fouragerend.
6. Rotgans. (Branta b. bernicla)  
 Overtrekkend.
7. Bergeend. (Tadorna tadorna)  
 Enige keren nam ik in de grote vijver een paartje waar. Soms zat er een in een holle notebloom.
8. Wilde Eend. (Anas pl. platyrhynchos)  
 Broed- en trekvogel.
9. Wintertaling. (Anas cr. crecca)  
 In het winterhalfjaar nogal eens een paartje in de grote vijver. Dit najaar (1943) 3 exemplaren.
10. Zomertaling. (Anas querquedula)  
 In het voorjaar nogal eens een paartje in de grote vijver. In de omtrek waarschijnlijk broedvogel.
11. Slobeend. (Spatula clypeata)  
 Slechts eenmaal een mannetje in de grote vijver waargenomen.
12. Bruine Kiekendief. (Circus ae. aeruginosus)  
 Vertoont zich na de broedtijd wel eens.
13. Sperwer. (Accipiter n. nisus)  
 Gedurende het winterhalfjaar houden zich altijd verscheidene exemplaren op "Ter Hooge" op. Ze voeden zich waarschijnlijk grotendeels met Boekvinken, Spreeuwen en Koperwieken.
14. Ruigpootbuizerd. (Buteo l. lagopus)  
 Zeldzame trekker of wintergast.
15. Buizerd. (Buteo b. buteo)  
 Geregeld in het winterhalfjaar 3 á 4 exemplaren.
16. Zeearend. (Haliaeetus a. albicilla)  
 9 December 1933 een juv. exemplaar.
17. Zwartbruine Milaan. (Milvus migrans migrans)  
 1 exemplaar op 12 September 1933.

18. Wespendief. (Pernis a. apivorus)  
Indertijd nam ik eens een paartje waar bij het uithalen van wespennesten. In 1943 vernam ik echter, dat er dat jaar ook weer een exemplaar heeft gezeten. De arbeiders bleken de vogel heel goed te kennen en nemen hem bijna ieder jaar in de trektijd waar.
19. Slechtvalk. (Falco p.peregrinus)  
Ieder jaar tussen September en half Mei 2 à 3 exemplaren.
20. Boomvalk. (Falco s.subbuteo)  
Ieder jaar vanaf eind April tot ongeveer Oktober; in Augustus zag ik soms 5 exemplaren tegelijk, dus zeer waarschijnlijk broedvogel.
21. Smelleken. (Falco columbarius aesalon)  
Gedurende herfst en winter. Waarschijnlijk minder aan de plaats gebonden dan de andere roofvogels.
22. Torenvalk. (Falco t.tinnunculus)  
Ieder jaar minstens 3 broedparen; altijd enkele overwinterend. De meest algemene roofvogel.
23. Patrijs. (Perdix p.perdix)  
Blijkbaar broedvogel op de plaats zelf, want eens vond ik op een grasveld een heel klein levend jong. In de omtrek tegenwoordig talrijk, waarschijnlijk doordat in de oorlog een stukje graan werd verbouwd.
24. Fazant. (Phasianus o.colchicus)  
Tijdens het maaien broedend gevonden op een grasveld. Vertoonde zich najaar 1943 ook weer.
25. Waterral. (Rallus a. aquaticus)  
28 Oktober 1943 een exemplaar in jong dennenbos!
26. Waterhoen. (Gallinula chl.chloropus)  
Ieder jaar enkele broedparen. Waarschijnlijk worden veel jongen door ratten opgegeten. In de trektijd soms zeer talrijk, vooral vroeger. Ik heb de indruk, dat de vogel, ook als broedvogel sterk is afgenomen.
27. Meerkoet. (Fulica a.atra)  
In het voorjaar soms op de vijvers; broeden nooit geconstateerd.
28. Kievit. (Vanellus vanellus)  
Eenmaal op het ijs in de kleine vijver. Natuurlijk als overtrekker bekend. In de omgeving nog broedend, maar sterk afnemend, vanwege het lage polderpeil (en gescheurd weiland en kunstmest?)
29. Scholekster. (Haematopus o.ostralegus)  
Overtrekkend; in de omtrek waarschijnlijk broedend.
30. Klunt. (Recurvirostra avocetta)  
Een enkele maal overtrekkend.
31. Tureluur. (Tringa tot.totanus)  
Evenals de Kievit de laatste jaren veel zeldzamer geworden in de omgeving. Behalve de lage polderpeil (1930 trad het electrisch gemaal in werking) moet de oorzaak waarschijnlijk ook gezocht worden in het vroeger maaien, de kunstmesttoediening en - vooral de laatste tijd - het scheuren van grasland.
32. Oeverloper. (Tringa hypoleucos)  
In de voorjaarstrectijd (Mei) neem ik nogal eens een exemplaar waar aan de grote of kleine vijver.
33. Witgatje. (Tringa ochropus)  
Vroeger in de trektijd (Augustus-September) bepaald talrijk aan de grote vijver (troepen ! van 14-20 exemplaren !). Dikwijls zaten ze dan in de bomen en ook haadden ze, door in snelle vaart op het water in te schieten (2 Sept. 1933). Ook in het voorjaar in veel kleiner aantal, doortrekkend. Zeer sterk afgenomen, ook het aantal overtrekkende exemplaren.

34. Grote Wulp. (Numenius a. arquata)  
Vooral 's-nachts in Aug-Sept. overtrekkend en overdag op de weiden fouragerend; ook dagtrekker.
35. Regenwulp. (Numenius ph. phaeopus)  
Vooral in Augustus en September overdag en soms 's nachts overtrekkend; ook wel op de omringende weiden fouragerend.
36. Houtsnip. (Scolopax r. rusticola)  
In najaar en winter enige ex. in het bos. Volgens de arbeiders vroeger talrijker. Bonte Kraai en Houtsnip komen tegelijk zegt 't volk.
37. Watersnip. (Capella g. gallinago)  
10 jaar terug in de trektijd nog algemeen op de weiden. Nu minder.
38. Zilvermeeuw. (Larus a. argentatus)  
Indertijd viste een ex. enige goudwinden uit de kleine vijver.
39. Visdief. (Sterna h. hirando)  
In voorjaar of zomer soms vissend.
40. Kokmeeuw. (Larus r. ridibundus)  
Soms in de zomer in menigte boven de tuin jagend op insecten.
41. Houtduif. (Columba p. palumbus)  
Zeer talrijk als broed- en zwerfvogel.
42. Holenduif. (Columba oenas)  
Broedend in holle bomen en klimop (huis). Talrijk, 't gehele jaar.
43. Tortelduif. (Streptopelia t. turtur)  
Zeer algemene somervogel; ook algemeen broedend.
44. Koskoek. (Cuculus can. canorus)  
Algemene somervogel, waarschijnlijk veel parasiterend op Tuinfluiters.
45. IJsvogel. (Alcedo atthis ispida)  
Ieder jaar tussen Juni/Juli (vroegste datum 9 Juni '35) en Mei boven de vijvers. Soms 3 ex, tegelijk. Vanwege de strenge winters sterk gedecimeerd; schijnt zich echter snel te herstellen.
46. Kerkuil. (Tyto alba subsp.)  
Broedend in holle bomen. Heeft waarschijnlijk nogal sterk geleden van de strenge winters, althans hoorde ik zijn roep de laatste jaren haast niet.
47. Ransuil. (Asio o. otus)  
In winter en lente 1936 oa. een viertal in klimop, welke tegen een Iep groeide. Na verwijdering hiervan, zag ik de vogels niet meer.
48. Steenuil. (Athene noctua vidalii)  
Een zeer algemeen vogeltje op de Zeeuwse eilanden en dus op "Ter Hoogé" ook. Vooral in de jaren 34/35 bepaald talrijk. Heeft zich bijna geheel hersteld van de schade door de strenge winters.
49. Gierzwaluw. (Apus a. apus)  
Vooral tegen de avond boven de plaats vliegend; waarschijnlijk zijn dit ex. uit Middelburg.
50. Groene Specht. (Picus viridis vireascens)  
Slechts eenmaal waargenomen, zittend tegen een grove den.
51. Grote Bonte Specht. (Dryobates major pinetorum)  
Vooral op de trek in voor- en najaar; jaren geleden had ik eens een grote troep waar in de trektijd in iepenbos. Hakt veel holen voor Spreeuwen e.a. uit. Broeden is nog onzeker.
52. Kleine Bonte Specht. (Dryobates minor subsp.)  
Eenmaal waargenomen in het beukenlaantje.
53. Boerenzwaluw (Hirundo r. rustica)  
Nestelend onder de twee ballons van 't huis. Afgenomen?
54. Huiszwaluw. (Delichon u. urbica)  
Nestelend op de boerderij. Vooral in Okt.-Sept. in grote zwermen tussen de Boerenzwaluwen boven de vijver "warrelend".

55. Kransvogel. (Turdus pilaris)  
Op de plaats en omringende weiden, gedurende de trektijden.
56. Koperviek. (Turdus a. musicus)  
Evenals 55 doortrekker en overwinteraar, echter algemener.  
In November ieder jaar in grote troepen overnachtend in het hakhout.
57. Grote Lijster. (Turdus v. viscivorus)  
Tegenwoordig algemeene broed- en trekvogel.
58. Zanglijster. (Turdus ericetorum)  
Algemene broedvogel en doortrekker.
59. Beflijster. (Turdus t. terquatus)  
Slechts eenmaal in April op de trek waargenomen.
60. Merel. (Turdus m. merula)  
Zeer algemeene broed- en trekvogel.
61. Gekraaide Roodstaart. (Phoenicurus ph. phoenicurus)  
Tegenwoordig ieder jaar verscheidene broedparen (ook in nestkastje).  
Is waarschijnlijk algemener dan vroeger.
62. Nachtegaal. (Luscinia m. megarhyncha)  
Een paar maal in Mei een zingend ex. De laatste twee jaar ongeveer de  
hele zomer 1 ex. Zou wel eens een poging tot vestiging kunnen doen.  
Misschien zijn het ex. die door de aanleg van versterkingen in de duinen  
van daar verdreven zijn.
63. Roodborst. (Erithacus rubecula subsp.)  
Algemene broed- en wintervogel.
64. Bastaardnachtegaal. (Prunella m. modularis)  
Eenige jaren geleden nog algemeen. Tegenwoordig verre van algemeen. Het is  
zeer de vraag of dit op rekening van de strenge winters moet worden ge-  
schreven!
65. Grasmus. (Sylvia c. communis)  
Algemene zomervogel, echter meer in meidoornbosjes op de weiden, dan op  
de plaats zelf, waar de Tuinfluiter hem in het hoger opgaand hout groten-  
deels vervangt.
66. Braamsluiper. (Sylvia c. curruca)  
Een enkel paartje, meestal in de buurt van de tuin of de boerderij.
67. Tuinfluiter. (Sylvia borin)  
Met de Fitis wel de algemeenste zanger.
68. Zwartkoptuinfluiter. (Sylvia a. atricapilla)  
Nogal plaatselijke broedvogel.
69. Tijftjaf. (Phylloscopus c. collybita)  
Nogal plaatselijke broedvogel; waarschijnlijk iets toegenomen.
70. Fitis. (Phylloscopus tr. trochilus)  
Wel de talrijkste zomerzanger.
71. Boarietzanger. (Acrocephalus palustris)  
Vertoont zich vooral in de zomer nogal eens op de plaats en imiteert dan  
druk andere vogels (Tuinfluiter). Niet zeker als broedvogel; wel in de  
omgeving.
72. Rietzanger. (Acrocephalus schoenobaenus)  
Is in de omgeving zeer algemeen.
73. Spotvogel. (Hippolais ictarina)  
Een algemeene broedvogel. (Imiteert graag Boornvalk en Scholekater).
74. Winterkoning. (Troglodytes tr. troglodytes)  
Algemene broed- en standvogel.
75. Grauwe Vliegenvanger (Musciapa str. striata)  
Vooral bij het huis maar ook op de plaats talrijke broedvogel.

76. Bonte Vliegenvanger. (*Muscicapa h.hypoleuca*)  
Slechts een paar maal in de voorjaartrektijd waargenomen, achteraf ook in herfst in najaarskleed gezien.
77. Boompieper. (*Anthus tr.trivialis*)  
10 jaar geleden in de nazomer vrij algemeen.  
Later niet meer opgemerkt.
78. Graspieper. (*Anthus pratensis*)  
Overvliegend; in de omgeving algemeen.
79. Akkerleeuwerik. (*Alauda arv.arvensis*)  
In het najaar soms druk overtrekkend; in de omgeving algemeen.
80. Gele Kwikstaart. (*Motacilla fl.flava*)  
Vertoont zich vooral, wanneer het peil van de vijvers in droge zomers sterk daalt; alsdan fouragerend tussen de modder. Ook tijdens het leegpompen der kleine vijver, welke indertijd werd uitgediept, vertoonde dit aardige vogeltje zich steeds. In de omgeving vrij algemeen.
81. Witte kwikstaart. (*Motacilla a.alba*)  
Broedend tegen het huis en overal op gunstige plaatsen. Treedt dikwijls op in de tuin en loopt op de vijver over eendekroos. Algemeen.
82. Koolmees. (*Parus m.major*)  
Talrijke broedvogel.
83. Pimpelmees. (*Parus c.caeruleus*)  
Talrijke broed- en zwerfvogel.
84. Zwarte Mees. (*Parus n.ater*)  
Doortrekker in voor- en najaar; vooral talrijk in 1933/34; in 1943 ook wel enkele maar veel minder dan in 1933. Houdt zich uitsluitend in coniferen (vooral *Larix* en *Picea oxeolisa*) op.
85. Staartmees. (*Aegithalos caudatus Europ.*) en Doodskopje (*Aegithalos c.caudatus*)  
Vooral op de trek, maar ook broedend, algemeen maar niet talrijk.
86. Boomkruiper. (*Certhia brachydactula subsp.*)  
Algemeen en talrijk het hele jaar door.
87. Goudhaantje. (*Regulus r.regulus*)  
In najaar, winter en voorjaar zeer algemeen.
88. Vuurgoudhaantje. (*Regulus ign.ignicapillus*)  
Waarschijnlijk wat minder algemeen dan *Regulus*; 1943/44 echter evenals 87 talrijk optredend. Beide zijn op "Ter Hooge" (nog) trekkers. (in de toekomst lijkt mij een vestiging niet onmogelijk).
89. Raaf. (*Corvus corax corax*)  
Volgens verschillende personen ongeveer 30 jaar geleden nog broedvogel ("eenzaamheid")!!!!  
Bij de oude tuinbaas kweekte men de jongen in een kooi op.
90. Bonte Kraai. (*Corvus cornix cornix*)  
Algemeen gedurende het winterhalfjaar; tegelijk met de Roeken overnachtend. Schijnt voor de spijsvertering elastiekjes (van het strand?) te gebruiken; ik vond deze in groot aantal in de uitwerpselen tusschen schelpstukjes, enz.
91. Zwarte Kraai. (*Corvus corone corone*)  
Vrij algemeen solitair broedend; waarschijnlijk toenemend.  
Dikwijls stoeiend met roofvogels evenals de andere Corviden.
92. Roek. (*Corvus fr.frugilegus*)  
Enige jaren geleden een enorme kolonie, welke door het stelselmatig uithalen der jongen tot ongeveer 40 nesten (1943) is geslonken.  
Als overwinteraar ook overnachtend.
93. Kauw. (*Coloeus monedula spermologus*)  
Algemene broedvogel van helle bomen en schoorstenen van het huis.  
Ook broedde hij met goed gevolg in een nestkast.

94. Ekster. (Pica p.pica)  
Broedvogel. Is zeer waarschijnlijk aanzienlijk toegenomen.
95. Vlaamsche Gaai. (Garrulus glandarius subsp.)  
Vrij algemene broed- en zwerfvogel; waarschijnlijk toegenomen.
96. Spreeuw. (Sturnus v.vulgaris)  
Talrijke broedvogel (boomholten, spechtenholten, huis, nestkasten).  
Enorm sterk bezette najaarsslaapplaats.
97. Wielewaal. (Oriolus o.oriolus)  
Vrij algemene broedvogel. Baadt, door zich halsoverkop in het water te laten vallen, ook wel, door er op Witgatjesmanier doorheen te vliegen.
98. Boekvink. (Fringilla c.coelebs)  
Broedvogel; als trekker waarschijnlijk sterk afgenomen.
99. Keep. (Fringilla montifringilla)  
Somme jaren (1933/34) talrijker doortrekker. 1943/44 hoegenaamd geen trek.  
Vooral op Larix en Iep.
100. Putter. (Carduelis carduelis subsp.)  
In 1933/34 tegelijk met Keep en Sijs vrij talrijk doortrekkend. In 1943 weer enkele. Is misschien ook broedvogel.
101. Sijs. (Carduelis spinus)  
Vroeger ieder jaar in vrij grote troepen doortrekkend (vooral 1933-34) De laatste jaren slechts sporadisch.
102. Barmsijs. (Carduelis fl. flammea) of Kleine Barmsijs (Carduelis flammea cabaret)  
Slechts eenmaal nam ik twee ex, waar. Of het de Noord-Europesche of de Middel-Europesche vorm betreft, weet ik helaas niet.
103. Kneu. (Carduelis cann. cannabina)  
Meest overvliegend of -trekkend, soms zingend; broeden is mij niet bekend.
104. Huisemus. (Passer d. domesticus)  
Vooral bij het huis, de tuin en de boerderij. Waarschijnlijk toegenomen.
105. Ringmus. (Passer m. montanus)  
Zeer algemeen; ook in nestkasten nestelend. Vooral in April talrijk.
106. Midden-Europesche Kanarie. (Serinus canarius germanicus)  
Juli 1940 4 ex. in de tuin zingend, steeds weer terugkerend.  
Dit is dubieus, aangezien ik thans (1957) de Europesche kanarie goed ken; het zingen van de in 1940 waargenomen vogels was m.i. te mooi, terwijl er in die tijd tengevolge van de bommen veel losgelaten en ontsnapte kooi-kanaries rondvlogen in ons land.
107. Groenling. (Chloris chl. chloris)  
Tegenwoordig vrij talrijk, vooral in kastanjes nestelend; evenals de Ringmus een optimum in April. Is vast toegenomen.
108. Geelgors. (Emberiza c. citrinella)  
Meest overvliegend. In de omgeving tamelijk algemeen.
109. Rietgors. (Emberiza sch. schoeniclus)  
In de omgeving vrij algemeen.
110. Bosuil. Thans (1957) weet ik zeker dat de vogel op "Ter Hooge" voorkwam; (geluid indertijd onbekend)
111. Kleine Karekiet idem als 72.