Opgemaakt eind 1943. Auteur Anton van Lynden

Vogels, waargenomen op de buitenplaats "Ter Hooge".

1. Dodaars. (Podiceps r. ruficollis)
Tegenwoordig geregeld in minstens 2 paren broedend. In 1939 ontdekte ik voor 't eerst de jongen. Waarschijnlijk vond het broeden al een paar jaar eerder plaats. Bijna zeker is het, dat het dichtgroeien van de vijver het optreden dezer soort in gunstigen zin heeft beïnvloed.

X2. Aalscholver. (Phalacrocorax carbo sinensis)
4 April 1942 kwam een ex. uit Oostelijke richting naar de groote vijver, waar het herhaaldelijk trachtte zich in een abeel tusschen de aldaar nestelende Blauwe Reigers neer te zetten, hetgeen steeds door de Roeken werd belet.

3. Blauwe Reiger. (Ardea c. cinerea)
Sinds 1938 broedend en wel in toenemend aantal; 1943: 38 nesten, de meeste in Abeelen.

4. Ooievaar. (Ciconia c. ciconia)
Jaren geleden wel eens overtrekkend; volgens de arbeiders vroeger dikwijls op de omliggende weiden fourageerend en blijkens oude gravures in die tijd op het kasteel broedend.

5. Grauwe Gans. (Anser anser)
In het najaar overtrekkend; vroeger op het ondergeloopen weiland fourageerend.

6. Rotgans. (Branta b. bernicla)
Overtrekkend.

7. Bergeend. (Tadorna tadorna)
Eenige keeren nam ik in de groote vijver een paartje waar. Soms zat er een op een holle nooteboom.

8. Wilde Eend. (Anas pl. platyrhyncha)
Broed- en trekvogel.

9. Wintertaling. (Anas cr. crecca)
In het winterhalfjaar nogal eens een paartje in de groote vijver. Dit najaar (1943) 3 ex.

10. Zomertaling. (Anas querquedula)
In het voorjaar nogal eens een paartje in de groote vijver. In de omtrek waarschijnlijk broedvogel.

11. Slobeend. (Spatula clypeata)
Slechts eenmaal een mannetje in de groote vijver waargenomen.

12. Bruine Kiekendief. (Circus ae. aeruginosus)
Vertoont zich na de broedtijd wel eens.

13. Sperwer. (Accipiter n. nisus)
Gedurende het winterhalfjaar houden zich altijd verscheidene ex. op "Ter Hooge" op. Ze voeden zich waarschijnlijk grootendeels met Boekvinken, Spreeuwen en Koperwieken.

14. Ruigpootbuizerd. (Buteo l. lagopus)
Zeldzame trekker of wintergast.

15. Buizerd. (Buteo b. buteo)
Geregeld in het winterhalfjaar 3 à 4 ex.

16. Zeearend. (Haliaëtus a. albicilla)
9 December 1933 een juv. ex.

17. Zwartbruine Milaan. (Milvus migrans migrans)
1 ex. op 12 September 1933.

18. Wespendief. (Pernis a. apivorus)
Indertijd nam ik eens een paartje waar bij het uithalen van wespennesten. In 1943 vernam ik echter, dat er dat jaar ook weer een ex. heeft gezeten. De arbeiders bleken de vogel heel goed te kennen en nemen hem bijna ieder jaar in de trektijd waar.

19. Slechtvalk. (Falco p. peregrinus)
Ieder jaar tusschen September en half Mei 2 à 3 ex.

20. Boomvalk. (Falco s. subbuteo)
Ieder jaar vanaf eind April tot ong. October; in Augustus zag ik soms 5 ex. tegelijk, dus zeer waarschijnlijk broedvogel.

21. Smelleken. (Falco columbarius aesalon)
Gedurende herfst en winter. Waarschijnlijk minder aan de plaats gebonden dan de andere roofvogels.

22. Torenvalk. (Falco t. tinnunculus)
Ieder jaar minstens 3 broedparen; altijd enkele overwinterend. De meest algemeene roofvogel.

23. Patrijs. (Perdix p. perdix)
Blijkbaar broedvogel op de plaats zelf, want eens vond ik op een grasveld een heel klein levend jong. In de omtrek tegenwoordig talrijk.
24. Fazant. (Phasianus c. colchicus)
Tijdens het maaien broedend gevonden op een grasveld. Vertoonde zich dit najaar ook weer.
25. Waterral. (Rallus a. aquaticus)
28 October 1943 een ex. in jong dennebosch!
26. Waterhoen. (Gallinula chl. chloropus)
Ieder jaar enkele broedparen. Waarschijnlijk worden veel jongen door ratten opgegeten. In de trektijd soms zeer talrijk, vooral vroeger. Ik heb de indruk, dat de vogel, ook als broedvogel sterk is afgenomen.
27. Meerkoet. (Fulica a. atra)
In het voorjaar soms op de vijvers; nooit broeden geconstateerd.
28. Kievit. (Vanellus vanellus)
Eenmaal op het ijs in de kleine vijver. Natuurlijk als overtrekker bekend. In de omgeving nog broedend, maar sterk afnemend, vanwege het lage polderpeil (en gescheurd weiland en kunstmest?).
29. Scholekster. (Haematopus o. ostralegus)
Overtrekkend; in de omtrek waarschijnlijk broedend.
30. Kluut. (Recurvirostra avocetta)
Een enkele maal overtrekkend.
31. Tureluur. (Tringa tot. totanus)
Evenals de Kievit de laatste jaren veel zeldzamer geworden in de omgeving. Behalve het lage polderpeil (1930 trad het electrisch gemaal in werking) moet de oorzaak waarschijnlijk ook gezocht worden in het vroeger maaien, de kunstmesttoediening en -vooral de laatste tijd- het scheuren van grasland.
32. Oeverlooper. (Tringa hypoleucos)
In de voorjaarstrektijd (Mei) neem ik nogal eens een ex. waar aan de groote of kleine vijver.
33. Witgatje. (Tringa ochropus)
Vroeger in de trektijd (Augustus-September) bepaald talrijk aan de groote vijver (troepen (!) van 14 - 20 ex.!). Dikwijls zaten ze dan in de boomen en ook baadden ze, door in snelle vaart op het water in te schieten (2 Sept. 1933). Ook in het voorjaar in veel kleiner aantal, doortrekkend. Zeer sterk afgenomen, ook het aantal overtrekkende ex.
34. Groote Wulp. (Numenius a. arquata)
Vooral 's-nachts in Aug-Sept. overtrekkend en overdag op de weiden foerageerend; ook dagtrekker.
35. Regenwulp. (Numenius ph. phaeopus)
Vooral in Augustus en September overdag en soms 's-nachts overtrekkend; ook wel op de omringende weiden foerageerend.
36. Houtsnip. (Scolopax r. rusticola)
In najaar en winter eenige ex. in het bosch. Volgens de arbeiders vroeger talrijker. Bonte Kraai en Houtsnip komen tegelijk zegt 't volk.
37. Watersnip. (Capella g. gallinago)
10 jaar terug in de trektijd nog algemeen op de weiden. Nu minder.
38. Zilvermeeuw. (Larus a. argentatus)
Indertijd vischte een ex. eenige goudwinden uit de kleine vijver.
39. Vischdief. (Sterna h. hirundo)
In voorjaar of zomer soms visschend.
40. Kokmeeuw. (Larus r. ridibundus)
Eens in de zomer in menigte boven de tuin jagend op insecten.
41. Houtduif. (Columba p. palumbus)
Zeer talrijk als broed- en zwerfvogel.
42. Holenduif. (Columba oenas)
Broedend in holle boomen en klimop (huis). Talrijk,'t geheele jaar.
43. Tortelduif. (Streptopelia t. turtur)
Zeer algemeene zomervogel; ook algemeen broedend.
44. Koekoek. (Cuculus can. canorus)
Algemeene zomervogel, waarschijnlijk veel parasiteerend op Tuinfluiters.

45. IJsvogel.(Alcedo atthis ispida)
Ieder jaar tusschen Juni/Juli (vroegste datum: 9 Juni '35) en Mei boven de vijvers. Soms 3 ex. tegelijk. Vanwege de strenge winters sterk gedecimeerd; schijnt zich echter snel te herstellen.
46. Kerkuil.(Tyto alba subsp.)
Broedend in holle boomen. Heeft waarschijnlijk nogal sterk geleden van de strenge winters, althans hoorde ik zijn roep de laatste jaren haast niet.
47. Ransuil.(Asio o.otus)
In winter en lente 1936 oa. een viertal in klimop, welke tegen een Iep groeide. Na verwijdering hiervan, zag ik de vogels niet meer.
48. Steenuil.(Athene noctua vidalii)
Een zeer algemeen vogeltje op de Zeeuwsche eilanden en dus op "Ter Hooge" ook. Vooral in de jaren 34-35 bepaald talrijk. Heeft zich bijna geheel hersteld van de schade door de strenge winters.
49. Gierzwaluw.(Apus a.apus)
Vooral tegen de avond boven de plaats vliegend; waarschijnlijk zijn dit ex. uit de stad.
50. Groene Specht.(Picus viridis virescens)
Slechts eenmaal waargenomen, zittend tegen een grove den.
51. Groote Bonte Specht.(Dryobates major pinetorum)
Vooral op de trek in voor- en najaar; jaren geleden nam ik eens een groote troep waar in de trektijd in iepenbosch. Hakt veel holen voor Spreeuwen e.a. uit. Broeden is nog onzeker.
52. Kleine Bonte Specht.(Dryobates minor subsp.)
Eenmaal waargenomen in het beukenlaantje.
53. Boerenzwaluw.(Hirundo r.rustica)
Nestelend onder de twee balcons van 't huis. Afgenomen?
54. Huiszwaluw.(Delichon u.urbica)
Nestelend op de boerderij. Vooral in Oct.-Sept. in groote zwermen tusschen de Boerenzwaluwen boven de vijver "warrelend".
55. Kramsvogel.(Turdus pilaris)
Op de plaats en omringende weiden.
56. Koperwiek.(Turdus m.musicus)
Evenals 55 doortrekker en overwinteraar, echter algemeener. In November ieder jaar in groote troepen overnachtend in het hakhout.
57. Groote Lijster.(Turdus v.viscivorus)
Tegenwoordig algemeene broed- en trekvogel.
58. Midden Europeesche Zanglijster.(Turdus ericetorum clarkei)
Algemeene broedvogel.
58a. Noord-Europeesche Zanglijster.(Turdus ericetorum ericetorum)
Algemeene doortrekker.
59. Beflijster.(Turdus t.torquatus)
Slechts eenmaal in April op de trek waargenomen.
60. Merel.(Turdus m.merula)
Zeer algemeene broed- en trekvogel.
61. Gekraagde Roodstaart.(Phoenicurus ph.phoenicurus)
Ieder jaar verscheidene broedparen tegenwoordig (ook in nestkastje). Is waarschijnlijk algemeener dan vroeger.
62. Nachtegaal.(Luscinia m.megarhyncha)
Een paar maal in Mei een zingend ex. De laatste twee jaren ongeveer de heele zomer 1 ex. Zou wel eens een poging tot vestiging kunnen doen.
63. Roodborst.(Erithacus rubecula subsp.)
Algemeene broed- en wintervogel.
64. Bastaardnachtegaal.(Prunella m.modularis)
Eenige jaren geleden nog algemeen. Tegenwoordig bepaald een vogeltje, waar je naar moet zoeken. Het is zeer de vraag of de strenge winters hieraan debet zijn!
65. Grasmusch.(Sylvia c.communis)
Algemeene zomervogel, echter meer in meidoornboschjes op de weiden, dan op de plaats zelf, waar de Tuinfluiter hem in het hooger opgaand hout grootendeels vervangt.
66. Braamsluiper(Sylvia c.curruca).
Een enkel paartje, meestal in de buurt van de tuin of de boerderij.

67. Tuinfluiter.(Sylvia borin)
Met de Fitis wel de algemeenste zanger.
68. Zwartkop-Tuinfluiter.(Sylvia a.atricapilla)
Nogal plaatselijke broedvogel.
69. Tjiftjaf.(Phylloscopus c.collybita)
Nogal plaatselijke broedvogel; waarschijnlijk iets toegenomen.
70. Fitis.(Phylloscopus tr.trochilus)
Wel de talrijkste zomerzanger.
71. Boschrietzanger.(Acrocephalus palustris)
Vertoont zich vooral in de nazomer nogal eens op de plaats en imiteert dan druk andere vogels. Niet zeker als broedvogel; wel in de omgeving.
72. Rietzanger.(Acrocephalus schoenabaenus)
Is in de omgeving zeer algemeen.
73. Spotvogel.(Hippolaïs icterina)
Een algemeene broedvogel.
74. Winterkoning.(Troglodytes tr.troglodytes)
Algemeene broed- en standvogel.
75. Grauwe Vliegenvanger.(Muscicapa str.striata)
Vooral bij het huis, maar ook op de plaats talrijke broedvogel.
76. Bonte Vliegenvanger.(Muscicapa h.hypoleuca)
Slechts een paar maal in de voorjaarstrektijd waargenomen.
77. Boompieper.(Anthus tr.trivialis)
10 jaar geleden in de nazomer vrij algemeen. Later niet meer opgemerkt. Zou broedvogel kunnen zijn geweest.
78. Graspieper.(Anthus pratensis)
Overvliegend; In de omgeving algemeen.
79. Akkerleeuwerik.(Alauda arv.arvensis)
In het najaar soms druk overtrekkend; Inde omgeving algemeen.
80. Gele Kwikstaart.(Motacilla fl.flava)
Vertoont zich vooral, wanneer het peil van de vijvers in drooge zomers sterk daalt; alsdan fourageerend tusschen de modder. Ook tijdens het leegpompen der kleine vijver, welke indertijd werd uitgediept, vertoonde dit aardige vogeltje zich steeds. In de omgeving vrij algemeen.
81. Witte Kwikstaart.(Motacilla a.alba)
Broedend tegen het huis en overal op gunstige plaatsen. Treedt dikwijls op in de tuin en loopt op de vijver over eendekroos. Algemeen.
82. Koolmees.(Parus m.major)
Talrijke broedvogel.
83. Pimpelmees.(Parus c.caeruleus)
Talrijke broed- en zwerfvogel.
84. Zwarte Mees.(Parus a.ater)
Doortrekker in voor- en najaar; vooral talrijk in 1933/34; in 1943 ook weer vrij veel, maar minder dan 1933. Houdt zich uitsluitend in coniferen (vooral Larix en Picea excelsa) op.
85. Staartmees.(Aegithalos caudatus Europ.) en Doodskopje (Aegithalos c. caudatus)
Vooral op de trek, maar ook broedend. Algemeen, maar niet talrijk.
86. Boomkruiper.(Certhia brachydactyla subsp.)
Algemeen en talrijk het geheele jaar door.
87. Goudhaantje.(Regulus r.regulus)
In najaar, winter en voorjaar zeer algemeen.
88. Vuurgoudhaantje.(Regulus ign.ignicapillus)
Misschien iets minder talrijk dan regulus; 1943/44 echter zeer talrijk optredend evenals 87. Beide zijn op "Ter Hooge" trekkers, maar in de toekomst is vestiging niet uitgesloten.
89. Raaf.(Corvus corax corax)
Volgens verschillende personen ongeveer 30 jaar geleden nog broedvogel ("Eenzaamheid")!!!!! Bij de oude tuinbaas kweekte men de jongen in een kooi op.
90. Bonte Kraai.(Corvus cornix cornix)
Algemeen gedurende het winterhalfjaar; tegelijk met Roeken overnachtend. Schijnt voor de spijsverteering elastiekjes (van het strand?!) te gebruiken.

91. Zwarte Kraai.(Corvus corone corone)
Vrij algemeen solitair broedend; waarschijnlijk toenemend. Dikwijls stoeiend met roofvogels evenals de andere Corviden.
92. Roek.(Corvus fr.frugilegus)
Eenige jaren geleden een enorme kolonie, welke door het stelselmatig uithalen der jongen tot ong. 40 nesten (1943) is geslonken. Als overwinteraar ook overnachtend.
93. Kauw.(Coloeus monedula spermologus)
Algemeene broedvogel van holle boomen en schoorsteenen van het huis. Ook broedde hij met goed gevolg in een nestkast.
94. Ekster.(Pica p.pica)
Broedvogel.-Is zeer waarschijnlijk aanzienlijk toegenomen.
95. Vlaamsche Gaai.(Garrulus glandarius subsp.)
Vrij algemeene broed- en zwerfvogel; waarschijnlijk toegenomen.
96. Spreeuw.(Sturnus v.vulgaris)
Talrijke broedvogel (boomholten, spechtenholen, huis, nestkasten). Enorm sterk bezette najaarsslaapplaats.
97. Wielewaal.(Oriolus o.oriolus)
Vrij algemeene broedvogel. Baadt, door zich halsoverkop in het water te laten vallen; ook door er op Witgatjesmanier doorheen te vliegen.
98. Boekvink.(Fringilla c.coelebs)
Broedvogel. Als trekker sterk afnemend?
99. Keep.(Fringilla montifringilla)
Sommige jaren (1933/34) talrijke doortrekker. Veel op Larix en Iep.
100. Putter.(Carduelis carduelis subsp.)
In 1933/34 tegelijk met Keep en Sijs vrij talrijk doortrekkend. In 1943 weer enkele. Is misschien ook broedvogel.
101. Sijs.(Carduelis spinus)
Vroeger ieder jaar in vrij groote troepen doortrekkend (vooral 1933-34). De laatste jaren slechts sporadisch.
102. Barmsijs.(Carduelis fl.flammea) of Kleine Barmsijs (Carduelis flammea cabaret)
Slechts eenmaal nam ik twee ex. waar. Of het de Noord-Europeesche of de Middel-Europeesche vorm betreft, weet ik helaas niet.
103. Kneu.(Carduelis cann.cannabina)
Meest overvliegend of trekkend, soms zingend; broeden is mij niet bekend.
104. Huismusch.(Passer d.domesticus)
Vooral bij het huis, de tuin en de boerderij. Waarschijnlijk toegenomen.
105. Ringmusch.(Passer m.montanus)
Zeer algemeen; ook in nestkasten nestelend. Vooral in April talrijk.
106. Midden-Europeesche Kanarie.(Serinus canarius germanicus)
Juli 1940 4 ex. in de tuin zingend, steeds weer terugkeerend.
107. Groenling.(Chloris chl. chloris)
Tegenwoordig vrij talrijk, vooral in kastanjes nestelend; evenals de Ringmusch een optimum in April. Is vast toegenomen.
108. Geelgors.(Emberiza c.citrinella)
Meest overvliegend. In de omgeving tamelijk algemeen.
109. Rietgors.(Emberiza sch.schoeniclus)
In de omgeving vrij algemeen.